

インフルエンザ予防接種予診票

ふりがな			T・S・H
氏名	(男・女)	生年月日	年 月 日 (満 歳)
住所		電話番号	() -
接種年月日	令和 年 月 日	診察前の体温 <small>※当院にて検温いたします</small>	度 分

質 問 事 項	回 答 欄	
今日のインフルエンザ予防接種について説明書(裏面)を読みましたか。	はい	いいえ
今日の予防接種の効果や副反応などについて理解しましたか。	はい	いいえ
現在、何かの病気にかかっていますか。(病名)	はい	いいえ
治療(投薬など)を受けていますか。	はい	いいえ
その病気の主治医には、今日の予防接種を受けてよいと言われたか。	はい	いいえ
免疫不全と診断されたことがありますか	はい	いいえ
ニワトリの肉や卵などにアレルギーがありますか。	はい	いいえ
インフルエンザの予防接種を受けた事がありますか。	はい	いいえ
1.その際に具合が悪くなったことがありますか。	はい	いいえ
2.インフルエンザ以外の予防接種の際に具合が悪くなったことがありますか	はい	いいえ
ひきつけ(けいれん)を起こした事がありますか	はい	いいえ
1ヵ月以内に予防接種を受けましたか。	はい	いいえ
予防接種名()	はい	いいえ
心臓病・腎臓病・肝臓病・血液疾患などにかかったことがありますか。	はい	いいえ
病名()	はい	いいえ
その病気を診てもらっている医師に今日の予防接種を受けてよいと言われたか	はい	いいえ
最近1ヵ月以内に熱が出たり、病気にかかったりしましたか	はい	いいえ
(病名)	はい	いいえ
今日の予防接種について質問がありますか？	はい	いいえ
()	はい	いいえ
<女性の方へ>	はい	いいえ
妊娠中又は妊娠の可能性はありますか？	はい	いいえ
現在授乳中ですか？	はい	いいえ
医師の記入欄	以上の問診及び診察の結果、今日の予防接種は (可能 ・ 見合わせる)	
	医師のサイン	

医師の診察・説明を受け、予防接種の効果や副反応などについて理解した上で、接種を希望されますか？	ご本人のサイン
(希望します ・ 希望しません)	※本人が18歳未満の場合は保護者様のサインを記入してください。

記載頂きました個人情報 Wakuchin 接種の予診に関してのみ使用します。

インフルエンザワクチンの接種を受けられる方へ

＜ワクチンの効果と副反応＞

ワクチンの接種により、インフルエンザの発症を予防したり、たとえ発症しても症状が軽くすみます。そのため、インフルエンザによる重症化や死亡を予防する効果が期待されます。

副反応としては、まれにワクチンの接種直後から数日中に、発疹、じんましん、湿疹、多形紅斑、紅斑、かゆみなどがあらわれることがあります。全身症状として、発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、一過性の意識消失、めまい、リンパ節腫脹、嘔吐・嘔気、腹痛、下痢、食欲減退、関節痛、筋肉痛、咳嗽、動悸など、また局所症状として接種部位に発赤、腫脹、硬結、熱感、疼痛、しびれ感、小水疱などが認められることがあります。いずれも通常2～3日で消失します。蜂巣炎(細菌による化膿性炎症)、顔面神経麻痺などの麻痺、末梢性ニューロパチー、失神・血管迷走神経反応、しびれ感、ぶどう膜炎があらわれることがあります。非常にまれですが、次のような重大な副反応がみられることがあります。

(1)ショック、アナフィラキシー(じんましん、呼吸困難、血管浮腫など)、(2)急性散在性脳脊髄炎(接種後数日から2週間以内の発熱、頭痛、けいれん、運動障害、意識障害など)、(3)ギラン・バレー症候群(両手足のしびれ、歩行障害など)、(4)けいれん(熱性けいれんを含む)、(5)肝機能障害、黄疸、(6)喘息発作、(7)血小板減少性紫斑病、血小板減少、(8)血管炎(アレルギー性紫斑病、アレルギー性肉芽腫性血管炎、白血球破砕性血管炎など)、(9)間質性肺炎、(10)脳炎・脳症、脊髄炎、(11)皮膚粘膜眼症候群(Stevens-Johnson症候群)、(12)ネフローゼ症候群。なお、副反応による健康被害が生じた場合の救済については、健康被害を受けた人または家族が独立行政法人医薬品医療機器総合機構法に基づいて手続きを行うこととなります。

＜予防接種を受けることができない人＞

- ① 明らかに発熱のある人(37.5℃以上)
- ② 重篤な急性疾患にかかっていることが明らかな人
- ③ 過去にインフルエンザワクチンに含まれる成分で、アナフィラキシーを起こしたことがある人(他の医薬品投与でアナフィラキシーを起こしたことがある人は、予防接種を受ける前にお医者さんへその旨を伝え、判断を仰いでください)
- ④ その他、お医者さんが予防接種を受けることが不相当と判断した人

＜予防接種を受ける際に、お医者さんとよく相談しなくてはならない人＞

- ① 発育が遅く、お医者さんや保健師さんの指導を継続して受けている人
- ② カゼなどのひきはじめと思われる人
- ③ 心臓病、腎臓病、肝臓病、血液の病気などの基礎疾患がある人
- ④ 前回の予防接種を受けたときに、2日以内に発熱、発疹、じんましんなどのアレルギーを疑う症状がみられた人
- ⑤ 今までにけいれんを起こしたことがある人
- ⑥ 過去に免疫不全と診断されたことがある人および近親者に先天性免疫不全症の人がいる人
- ⑦ 間質性肺炎、気管支喘息などの呼吸器系疾患のある人
- ⑧ 薬の投与または食事(鶏卵、鶏肉など)で皮膚に発疹が出たり、体に異常をきたしたことがある人
- ⑨ 妊娠の可能性のある人

＜予防接種を受けた後の注意＞

- ① 接種後30分間は病院にいるなどして様子を観察し、アレルギー反応などがあればお医者さんとすぐに連絡を取れるようにしておきましょう。
- ② 接種当日の入浴は差し支えありませんが、注射した部位をこすることはやめましょう。
- ③ 接種当日は接種部位を清潔に保ち、いつも通りの生活をしましょう。ただし、はげしい運動や大量の飲酒は避けましょう。
- ④ 高熱やけいれんなどの異常な症状が出た場合は、速やかにお医者さんの診察を受けてください。